

P2.1

(1)

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy = 0$$

(2)

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x^2 + y^2 = 0 + 0 = 0$$

(3)

$(x, y) \rightarrow (0, 0)$ から、 $y = x$ とし、 $x \rightarrow 0$ を考える
そこで、

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) &= \lim_{(x,x) \rightarrow (0,0)} f(x,x) \\ &= \lim_{(x,x) \rightarrow (0,0)} x \sin \frac{1}{x} + x \sin \frac{1}{x} \\ &= 0 + 0 = 0 \end{aligned}$$

$\lim_{(x,x) \rightarrow (0,0)} x \sin \frac{1}{x} + x \sin \frac{1}{x}$ について、

$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x}$ は $0 \leq |\sin \frac{1}{x}| \leq 1$ より、 $0 \leq |x \sin \frac{1}{x}| \leq |x|$ の両辺の0での極限はとも
に0であるから、はさみうちの原理より $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$

P2.2

(1)

$F : A \rightarrow \mathbb{R}^M$ が $x_0 \in A$ で連続であることは

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{s.t. } \forall x \in A : \|x - x_0\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(x_0)\| < \epsilon$$

その否定は

$$\exists \epsilon_0 > 0, \text{s.t. } \forall \delta > 0, \exists x_\delta \in A, \text{s.t. } \|x_\delta - x_0\| < \delta \wedge \|f(x_\delta) - f(x_0)\| \geq \epsilon_0$$

(2)

$$\exists \epsilon_0 > 0, \text{s.t. } \forall \delta > 0, \exists x_\delta, y_\delta \in A, \text{s.t. } \|x_\delta - y_\delta\| < \delta \wedge \|f(x_\delta) - f(y_\delta)\| \geq \epsilon_0$$

(3)

$$\|{}^t(x, y) - {}^t(1, 1)\| < \delta \Rightarrow \|F(x, y) - {}^t(2, 1)\| < \epsilon = \frac{1}{19950728} \text{ ここで、}$$
$$\|{}^t(x, y) - {}^t(1, 1)\| < \sqrt{(x-1)^2 + (y-1)^2} < \delta \text{ から}$$

$$\begin{aligned} \|F(x, y) - {}^t(2, 1)\| &= \sqrt{(x^2 + y^2 - 2)^2 + (xy - 1)^2} \\ &= \sqrt{(x^2 + y^2 - 2)^2 + \frac{1}{4}(x^2 + y^2 - 2)^2} \\ &= \frac{\sqrt{5}}{2} \sqrt{(x^2 + y^2 - 2)^2} \end{aligned}$$

(4)

連続 \Rightarrow 一様連続であるが、逆にすると一般的に成立しない。また、直観的に考えると、一様連続な関数に対して、ある区間のうちに変化はあまり大きいではないが、連続関数では変化が大きにしても構わない

連続だが一様連続でない反例： $\frac{1}{x}$ が $(0, 1)$ では連続であるが一様連続でない

P2.3

図略、座標変換は原点を球心で、 r を半径とする球座標系である。また θ は z 軸となす角であり、 ϕ は x 軸の正方向と反時計回りになす角

A2.1

(1)

${}^t(x, y) \neq {}^t(0, 0)$ では、 $xy, \sqrt{x^2y^2}$ はともに連続関数で、 $\sqrt{x^2 + y^2} \neq 0$ から、 $f(x, y)$ も連続関数である

${}^t(x, y) \rightarrow {}^t(0, 0)$ のとき、 $\forall \epsilon > 0, \delta := 2\epsilon$ をとって、 $\|{}^t(x, y) - {}^t(0, 0)\| = \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$ をみたす ${}^t(x, y) \in \mathbb{R}^2$ に対して、 $x = y = 0, |f(x, y) - f(0, 0)| = 0 < \epsilon$

${}^t(x, y) \neq {}^t(0, 0)$,

$$\begin{aligned} |f(x, y) - f(0, 0)| &= \left| \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} - 0 \right| \\ &= \left| \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| \\ &= \frac{|xy|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ &\leq \frac{|x^2 + y^2|}{2\sqrt{x^2 + y^2}} \\ &\leq \frac{\sqrt{(x^2 + y^2)^2}}{2\sqrt{x^2 + y^2}} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{(x^2 + y^2)^2}{x^2 + y^2}} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{x^2 + y^2} \\ &< \frac{1}{2} \delta = \epsilon \end{aligned}$$

よって、 $f(x, y)$ は ${}^t(0, 0)$ で連続

(2)

$y = x$ に沿って、 ${}^t(0, 0)$ に近づくと、

$$\begin{aligned} \lim_{{}^t(x, y) \rightarrow {}^t(0, 0)} f(x, y) &= \lim_{{}^t(x, x) \rightarrow {}^t(0, 0)} f(x, x) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2}{x^2 + x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2}{2x^2} = \frac{3}{2} \neq 0 \end{aligned}$$

よって、 $f(x, y)$ は ${}^t(0, 0)$ で連続しない

(3)

x, y はともに0でないから、 $s := \frac{x}{y}$ とし、 $s \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x}{y} \sin \frac{y}{x} = \lim_{s \rightarrow 0} s \sin \frac{1}{s} = 0$$

よって、 $f(x, y)$ は ${}^t(0, 0)$ で連続

B2.2

(\Rightarrow)ここで $\{x^n\}_n$ を x^0 に収束する任意の数列とする

F は連続であるから、 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{s.t. } \forall x \in A$

$\|x - x_0\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(x_0)\| < \epsilon, \lim_{n \rightarrow \infty} x^n = x^0$ から

$\exists N \in \mathbb{N}, \text{s.t. } \forall n \geq N, \|x^n - x^0\| < \delta$

よって、 $n \geq N \Rightarrow \|f(x^n) - f(x^0)\| < \epsilon$

(\Leftarrow)対偶で考えよう

$\exists \epsilon > 0, \text{s.t. } \forall \delta > 0, \exists x^\delta \in A, \text{s.t. } \|x^\delta - x^0\| < \delta$ かつ $\|f(x^\delta) - f(x^0)\| \geq \epsilon$ とする

$\delta = \frac{1}{n}$ とすると、 $\exists \{x^n\}_n \subset A, \text{s.t. } \|x^n - x^0\| < \frac{1}{n}$ かつ $\|f(x^n) - f(x^0)\| \geq \epsilon$

前半より、 $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = x^0$

後半より、 $\liminf_{n \rightarrow \infty} \|f(x^n) - f(x^0)\| \geq \epsilon > 0$

言い換えれば、 $\{f(x^n)\}_n$ は $f(x^0)$ に収束しない、これは(2)の否定である

B2.3

Lem. Y の任意の閉集合 C に対し、 $f^{-1}(C)$ は \mathbb{R}^N での閉集合である

Proof of Lem. \mathbb{R}^M での開集合 D を考えることは、閉集合 $C = \mathbb{R}^M \setminus D$ と同じであるから、 $f^{-1}(C) = \mathbb{R}^N \setminus f^{-1}(D)$ より、 $f^{-1}(D)$ が開集合であることは $f^{-1}(C)$ が閉集合であることと同値である

$f(B) \subset \overline{f(B)}$ から、 $B \subset f^{-1}(\overline{f(B)})$ である。 $f^{-1}(\overline{f(B)})$ は閉集合であるから(**Lem**より)、 $\overline{B} \subset f^{-1}(\overline{f(B)})$ であり、 $f(\overline{B}) \subset \overline{f(B)}$

B2.4

Lem. (α -Hölder continuous) Hölder連続 $\stackrel{def}{\Leftrightarrow} \exists C, \alpha \in (0, 1], \text{s.t. } \forall x, y \in \mathbb{R}^n, \|f(x) - f(y)\| \leq C\|x - y\|^\alpha$

そして、Lipschitz連続な関数は必ずHölder連続であり、Hölder連続な関数は必ず一様連続である

Proof F をLipschitz連続とすると

$$\|F(x) - F(y)\| \leq L\|x - y\| = L\|x - y\|^\alpha \|x - y\|^{1-\alpha}$$

$$\|x - y\| \leq 1 \text{ なら、 } L\|x - y\|^\alpha \|x - y\|^{1-\alpha} \leq L\|x - y\|^\alpha$$

$$\|x - y\| > 1 \text{ なら、Weierstrassの最大値定理より、}$$

$$\exists m_{min}, m_{max} \in \mathbb{R}^M, \text{s.t. } m_{min} \leq F \leq m_{max}$$

$$\|f(x) - f(y)\| \leq \|f(x)\| + \|f(y)\| \leq 2m_{max} \leq 2m_{max}\|x - y\|^\alpha$$

すなわち、 $C := 2m_{max}$ とすればいい、このとき F はHölder連続である

F は一様連続 $\Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{s.t. } \forall x, y \in A$

$$\|x - y\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(y)\| < \epsilon$$

F は α -Hölder連続なので、

$$\|f(x) - f(y)\| \leq C\|x - y\|^\alpha < C\delta^\alpha \text{ から}$$

$$\delta = \sqrt[\alpha]{\frac{\epsilon}{C}} \text{ とすればいい}$$

このとき $\|f(x) - f(y)\| < C\delta^\alpha = C\left(\sqrt[\alpha]{\frac{\epsilon}{C}}\right)^\alpha = \epsilon$ から
 F は一様連続である