

4.1

(1)

$$\partial V = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid \frac{x^2}{4} + y^2 + z^2 = 1 \right\}$$

(2)

$$f(x, y, z) = \frac{x^2}{4} + y^2 + z^2, \nabla f = \begin{pmatrix} x \\ \frac{2}{2y} \\ 2z \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{n} = \frac{\nabla f}{\|\nabla f\|} \quad (1)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\frac{x^2}{4} + 4y^2 + 4z^2}} \begin{pmatrix} x \\ 2y \\ 2z \end{pmatrix} \quad (2)$$

(3)

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} \quad (3)$$

$$= 1 + 1 + 1 = 3 \quad (4)$$

(4)

$$\iiint_{\bar{V}} \nabla \cdot \mathbf{v} dx dy dz = \iiint_{\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid \frac{x^2}{4} + y^2 + z^2 \leq 1 \right\}} 3 dx dy dz \quad (5)$$

$$= 3 \iiint_{\left\{ \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid u^2 + v^2 + w^2 \leq 1 \right\}} 2 du dv dw \quad (6)$$

$$= 6 \int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-u^2}}^{\sqrt{1-u^2}} \int_{-\sqrt{1-u^2-v^2}}^{\sqrt{1-u^2-v^2}} dw dv du \quad (7)$$

$$= 6 \int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-u^2}}^{\sqrt{1-u^2}} 2 \sqrt{1-u^2-v^2} dv du \quad (8)$$

$$= 12 \int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-u^2}}^{\sqrt{1-u^2}} 2 \sqrt{1-u^2-v^2} dv du \quad (9)$$

$$= 12 \int_{-1}^1 \left(-\frac{1}{2} \pi (u^2 - 1) \right) du \quad (10)$$

$$= 6\pi \int_{-1}^1 (1-u^2) du \quad (11)$$

$$= 8\pi \quad (12)$$

ここで $\sigma(u, v) = \begin{pmatrix} 2 \sin u \cos v \\ \sin u \sin v \\ \cos u \end{pmatrix}$ とする。

$\sigma_u = \begin{pmatrix} 2 \cos u \cos v \\ \cos u \sin v \\ -\sin u \end{pmatrix}$, $\sigma_v = \begin{pmatrix} -2 \sin u \sin v \\ \sin u \cos v \\ 0 \end{pmatrix}$ であるから

$$\sigma_u \times \sigma_v = \begin{pmatrix} 2 \cos u \cos v \\ \cos u \sin v \\ -\sin u \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -2 \sin u \sin v \\ \sin u \cos v \\ 0 \end{pmatrix} \quad (13)$$

$$= \begin{pmatrix} \sin^2 u \cos v \\ 2 \sin^2 u \sin v \\ 2 \sin u \cos u \end{pmatrix} \quad (14)$$

で

$$\iint_{\partial V} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{A} = \iint_{[0, \pi] \times [0, 2\pi]} \begin{pmatrix} 2 \sin u \cos v \\ \sin u \sin v \\ \cos u \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \sin^2 u \cos v \\ 2 \sin^2 u \sin v \\ 2 \sin u \cos u \end{pmatrix} dudv \quad (15)$$

$$= \iint_{[0, \pi] \times [0, 2\pi]} (2 \sin^3 u + 2 \sin u \cos^2 u) dudv \quad (16)$$

$$= 4\pi \int_0^\pi (\sin^3 u + \sin u \cos^2 u) du \quad (17)$$

$$= 4\pi [-\cos u]_0^\pi \quad (18)$$

$$= 8\pi \quad (19)$$

$$= \iiint_{\bar{V}} \nabla \cdot \mathbf{v} dx dy dz \quad (20)$$

Rem. 三重積分 $\iiint \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid \frac{x^2}{4} + y^2 + z^2 \leq 1 \right\} dx dy dz$ に対して、分割方法は二つがある。

$z = h > 0$ の平面による断面積に対して h に関して積分した体積の 2 倍 と 第一象限の体積の 8 倍

三重積分の別解の 1

まず $z = h > 0$ の平面による断面積 $S(h)$ を考える

断面の方程式は $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1 - h^2$ であるから、これは椭円 $\frac{x^2}{4(1-h^2)} + \frac{y^2}{1-h^2} = 1$ である

$$\begin{cases} x = 2\sqrt{1-h^2} \cdot u \\ y = \sqrt{1-h^2} \cdot v \end{cases} \text{ で変数変換すると、} \det J = \begin{vmatrix} 2\sqrt{1-h^2} & 0 \\ 0 & \sqrt{1-h^2} \end{vmatrix} = 2(1-h^2)$$

だから $S(h)$ は

$$S(h) = \iint_{u^2+v^2 \leq 1} 1 \cdot |\det J| dudv \quad (21)$$

$$= 2(1-h^2) \iint_{u^2+v^2 \leq 1} dudv \quad (22)$$

$$= 2(1-h^2) \int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-u^2}}^{\sqrt{1-u^2}} dv du \quad (23)$$

$$= 2(1-h^2)\pi \quad (24)$$

$$\iiint_{\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid \frac{x^2}{4} + y^2 + z^2 \leq 1 \right\}} dx dy dz = 2 \int_0^1 S(h) dh \quad (25)$$

$$= 2 \int_0^1 2(1 - h^2) \pi dh \quad (26)$$

$$= 4\pi \int_0^1 (1 - h^2) dh \quad (27)$$

$$= \frac{8}{3}\pi \quad (28)$$

だから、 $\iint_{\overline{V}} \nabla \cdot \mathbf{v} dx dy dz = 3 \cdot \frac{8}{3}\pi = 8\pi$

三重積分の別解の 2

$$\iiint_{\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid \frac{x^2}{4} + y^2 + z^2 \leq 1 \right\}} dx dy dz = 8 \int_0^1 \int_0^{2\sqrt{1-z^2}} \int_0^{\sqrt{1-z^2 - \frac{x^2}{4}}} dy dx dz \quad (29)$$

$$= 8 \int_0^1 \int_0^{2\sqrt{1-z^2}} \sqrt{1 - z^2 - \frac{x^2}{4}} dx dz \quad (30)$$

$$= 4\pi \int_0^1 (1 - z^2) dz \quad (31)$$

$$= \frac{8}{3}\pi \quad (32)$$

だから、 $\iint_{\overline{V}} \nabla \cdot \mathbf{v} dx dy dz = 3 \cdot \frac{8}{3}\pi = 8\pi$

4.2

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = y + 0 + 2y = 3y \quad (33)$$

であるから

$$\iint_{\partial T} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{A} = \iiint_{\bar{T}} \nabla \cdot \mathbf{v} dx dy dz \quad (34)$$

$$= \iiint \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x+y+z \leq 1, x, y, z \geq 0 \right\} 3y dx dy dz \quad (35)$$

$$= 3 \int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} y dz dy dx \quad (36)$$

$$= 3 \int_0^1 \int_0^{1-x} (y - xy - y^2) dy dx \quad (37)$$

$$= 3 \int_0^1 \left[\frac{1}{2} (1-x) y^2 - \frac{1}{3} y^3 \right]_0^{1-x} dx \quad (38)$$

$$= 3 \int_0^1 \left(\frac{1}{2} (1-x)^3 - \frac{1}{3} (1-x)^3 \right) dx \quad (39)$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 (1-x)^3 dx \quad (40)$$

$$= \frac{1}{8} \quad (41)$$