

## Contents

0.1	3
0.2	3
0.3	4
0.4	4
0.5	4
0.6	5
<b>1</b>	<b>6</b>
1.1	6
1.2	6
1.3	6
1.4	6
1.5	6
1.6	7
1.7	7
<b>2</b>	<b>8</b>
2.1	8
2.2	8
2.3	8
2.4	8
2.5	9
2.6	9
<b>3</b>	<b>10</b>
3.1	10
3.2	10
3.3	11
3.4	11
<b>4</b>	<b>13</b>
4.1	13
4.2	13
4.3	13
4.4	13
4.5	14
4.6	14
4.7	15
<b>5</b>	<b>16</b>
5.1	16
5.2	16
5.3	16
5.4	17
5.5	17
5.6	17
5.7	17
5.8	18
5.9	18

<b>6</b>		<b>18</b>
6.1	.....	18
6.2	.....	19
6.3	.....	19
6.4	.....	20
<b>7</b>		<b>21</b>
7.1	.....	21
7.2	.....	21
7.3	.....	21
7.4	.....	22
<b>8</b>		<b>23</b>
8.1	.....	23
8.2	.....	23
8.3	.....	23
8.4	.....	23
8.5	.....	23
8.6	.....	23
8.7	.....	23
8.8	.....	23
8.9	.....	23
<b>9</b>		<b>24</b>
9.1	.....	24
9.2	.....	24
9.3	.....	24
<b>10</b>		<b>26</b>
10.1	.....	26
10.2	.....	26
10.3	.....	26
10.4	.....	26
10.5	.....	26
10.6	.....	26
10.7	.....	26
10.8	.....	27

**0****0.1**

(1)

$$\sup(0, 2] = 2$$

(2)

$$\sup(0, 2) = 2$$

(3)

$$\inf\left\{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}\right\} = 0$$

(4)

$$\inf\{n \mid n \in \mathbb{Z}_{>0}\} = 1$$

(5)

$$\inf\{x \mid x \in \mathbb{R}_{>0}\} = 0$$

(6)

$$\sup\left\{e^{-\frac{1}{x}} \mid x > 0\right\} = 1$$

**0.2**

(1)

$\beta < \infty, \beta = \min\{k \mid S \subset (-\infty, k]\}$  ので、 $\forall \epsilon > 0, S \not\subset (-\infty, \beta - \epsilon]$   $\implies \exists s \in S, s.t. s \notin (-\infty, \beta - \epsilon]$ . つまり  $\exists s \in S, s.t. \beta - \epsilon < s \leq \beta$ . 一方、 $S \subset (-\infty, \beta]$  であるから、 $s \in S \subset (-\infty, \beta] \iff s \in (-\infty, \beta]$ . よって、 $\exists s \in S, \beta - \epsilon < s \leq \beta$

(2)

$\beta = \infty \iff S$  が上に有界ではない  $\iff \neg(\exists k \in \mathbb{R}, s.t. S \subset (-\infty, k]) \iff \forall k \in \mathbb{R}, S \not\subset (-\infty, k] \iff \forall k \in \mathbb{R}, \exists s \in S, s.t. s \notin (-\infty, k]$ .  $k = M$  とすると、 $\exists s \in S, s > M$

(3)

$\beta < \infty \quad \forall n \in \mathbb{N}, \exists s \in S, s.t. \beta - \frac{1}{n} < s \leq \beta$  で、この  $s$  を  $s_n$  とおくと、 $\beta - \frac{1}{n} < s_n \leq \beta$  となり、 $n \rightarrow \infty$  とすると、 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n \leq \beta$

$\beta = \infty \quad \forall n \in \mathbb{N}, \exists s \in S, s.t. s > n = M$ . この  $s$  を  $s_n$  とおくと、 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \infty$

(4)

$S \subset S'$  のとき、 $\beta < \infty$  ならば、 $\beta = \min \{k | S \subset (-\infty, k]\} \leq \{k | S' \subset (-\infty, k]\} = \beta'$ .  $\beta = \infty$  のとき、 $S'$  も上に有界でないので、 $\beta' = \infty$

(5)

$\beta' \leq \beta$  とする。 $S \subset S' \cup S$  なので  $\sup(S \cup S') \geq \beta = \max\{\beta, \beta'\}$ . 一方で  $\beta < \infty$  のとき  $S \subset (-\infty, \beta]$ ,  $S' \subset (-\infty, \beta]$ . したがって、 $S \cup S' \subset (-\infty, \beta]$ ,  $\therefore \sup(S \cup S') \leq \beta = \max\{\beta, \beta'\}$

0.3

(1)

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, \emptyset \subset [a, b] \subset \begin{cases} [a, \infty) \\ (-\infty, b] \end{cases} \text{ があるから、}\{a \in \mathbb{R} | \emptyset \subset [a, \infty)\} = \{a | a \in \mathbb{R}\} = \{b \in \mathbb{R} | \emptyset \subset (-\infty, b]\} = \{b | b \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}$$

(2)

(1) より、 $\inf \emptyset = \max \{a | a \text{ は } \emptyset \text{ の下界}\} = \max \mathbb{R} = \infty, \sup \emptyset = \min \{b | b \text{ は } \emptyset \text{ の上界}\} = \min \mathbb{R} = -\infty$

0.4

(1)

$$(a - \epsilon, a + \epsilon)$$

(2)

$x \in (1, 2)$  とする。 $\epsilon := \frac{1}{2} \min \{x - 1, 2 - x\} > 0$  と取れば  $B(x, \epsilon) \subset (1, 2]$

(3)

開集合ではない

$0 \in [0, 1]$  である。 $\forall \epsilon > 0, B(0, \epsilon) \not\subset [0, 1]$  であるので、 $[0, 1]$  は開集合ではない

(4)

$[-1, 1] \subset \overline{[-1, 1]}$  は明らかに成立するので、以下は  $\overline{[-1, 1]} \subset [-1, 1]$  を示す。 $x \in \overline{[-1, 1]}$  とすると  $\forall \epsilon > 0, (x - \epsilon, x + \epsilon) = B(x, \epsilon) \cap [-1, 1] \neq \emptyset$  であるから、 $x + \epsilon \geq -1, x - \epsilon \leq 1$ . つまり  $-1 - \epsilon \leq x \leq 1 + \epsilon$  が任意の  $\epsilon > 0$  に対して成立するので、 $-1 \leq x \leq 1$

0.5

(1)

$$f^{-1}((0, 1)) = \{x \in [0, 2\pi] | \sin x \in (0, 1)\} = \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$$

(2)

 $(0, 1]$ 

(3),(4)

$x_0 \in f^{-1}(I)$  とおくと、 $f(x_0) \in I$ 、 $I$  は開区間なので、 $\exists \epsilon_0 > 0, s.t. B_1(f(x_0), \epsilon_0) \subset I$ . つまり、 $(f(x_0) - \epsilon_0, f(x_0) + \epsilon_0) \subset I$ . 一方で、 $f$  は  $[0, 2\pi]$  上連続なので、 $\exists \delta_0 > 0, s.t. \forall x \in [0, 2\pi], |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \epsilon_0$  となるので、 $\{x \in [0, 2\pi] : |x - x_0| < \delta_0\} \subset f^{-1}(I)$

**0.6** $\implies$ 

$\{a_n\}$  を  $\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N}, a_n \in A \\ a := \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \in \mathbb{R}^n \end{cases}$  とすると、 $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, s.t. \forall j \geq N, |a_j - a| < \epsilon$ . つまり  $a_j \in A \cap B(a, \epsilon)$ . したがって  $A \cap B(a, \epsilon) \neq \emptyset$ ,  $a \in \overline{A} = A$

 $\Leftarrow$ 

$a \in \overline{A}$  とする. このとき、 $\forall j \in \mathbb{N}, B\left(a, \frac{1}{j}\right) \cap A \neq \emptyset$  より、 $\exists a_j \in B\left(a, \frac{1}{j}\right) \cap A$  となる. このとき  $\lim_{j \rightarrow \infty} a_j = a \in A$

# 1

## 1.1

$(D1)$  と  $(D2)$  は明らかに成立するから、ここで  $(D3)$  だけ示す

$$\begin{aligned} (d_E(x, z))^2 &= \sum_{j=1}^n (x_j - z_j)^2 = \sum_{j=1}^n ((x_j - y_j) + (y_j - z_j))^2 \\ &= \sum_{j=1}^n (x_j - y_j)^2 + 2 \sum_{j=1}^n (x_j - y_j)(y_j - z_j) + \sum_{j=1}^n (y_j - z_j)^2 \\ &\leq \sum_{j=1}^n (x_j - y_j)^2 + 2 \sqrt{\left( \sum_{j=1}^n (x_j - y_j)^2 \right) \left( \sum_{j=1}^n (y_j - z_j)^2 \right)} + \sum_{j=1}^n (y_j - z_j)^2 \\ &= (d_E(x, y))^2 + 2d_E(x, y)d_E(y, z) + (d_E(y, z))^2 = (d_E(x, y) + d_E(y, z))^2 \end{aligned}$$

## 1.2

$(D1)$  と  $(D2)$  は明らかに成立するから、ここで  $(D3)$  だけ示す

$$d_1^{(n)}(x, z) = \sum_{j=1}^n |(x_j - y_j) + (y_j - z_j)| \leq \sum_{j=1}^n (|x_j - y_j| + |y_j - z_j|) = d_1^{(n)}(x, y) + d_1^{(n)}(y, z)$$

## 1.3

$$\begin{aligned} d_\infty^{(n)}(x, z) &= \max_j \{|(x_j - y_j) + (y_j - z_j)|\} \leq \max_j \{|x_j - y_j| + |y_j - z_j|\} \leq \max_j |x_j - y_j| + \max_j |y_j - z_j| = \\ &= d_\infty^{(n)}(x, y) + d_\infty^{(n)}(y, z) \end{aligned}$$

## 1.4

$x, y, z \in X$  を以下のように分ける

(1)  $x = y = z$ , (2-1)  $x = y \neq z$ , (2-2)  $x = z \neq y$ , (2-3)  $x \neq y \neq z$

	(1)	(2-1)	(2-2)	(2-3)	3
$d(x, z)$	0	0	1	1	1
$d(x, y)$	0	1	1	0	1
$d(y, z)$	0	1	1	0	1

## 1.5

### (1)

$$\begin{aligned} \frac{a+b}{1+a+b} &\leq \frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b} \\ (a+b)(1+a)(1+b) &\leq a(1+a+b)(1+b) + b(1+a+b)(1+a) \\ a(1+a)(1+b) + b(1+a)(1+b) &\leq a(1+a)(1+b) + b(1+a)(1+b) + ab(2+a+b) \\ 0 &\leq ab(2+a+b) \end{aligned}$$

### (2)

$$f'(t) = \frac{1}{(1+t)^2} > 0 \text{ から、 } f \text{ が単調増加である}$$

(3)

$$\tilde{d}(x, z) = \frac{d(x, z)}{1 + d(x, z)} \leq \frac{d(x, y) + d(y, z)}{1 + d(x, y) + d(y, z)} \leq \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)} + \frac{d(y, z)}{1 + d(y, z)} = \tilde{d}(x, y) + \tilde{d}(y, z)$$

**1.6**

$$\begin{aligned} d_\infty((x_n)_n, (z_n)_n) &= \sup |(x_n - y_n) - (y_n - z_n)| \\ &\leq \sup (|x_n - y_n| - |y_n - z_n|) \leq \sup |x_n - y_n| - \sup |y_n - z_n| \end{aligned}$$

**1.7**

(D3) は同様

$$\sup_{x \in [0,1]} |f(x) - g(x)| = 0 \text{ とする} \Rightarrow \forall x \in [0,1] f(x) - g(x) = 0 \implies f = g$$

## 2

### 2.1

(1)

$(a, b) \in A$  とする.  $N\left((a, b), \frac{a}{2}\right) \subset A$  から  $A$  は開集合である

(2)

$$\overline{A} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0 \right\}$$

(3)

$B$  が開集合でない  $\iff \exists (a, b) \in B, s.t. \forall \epsilon > 0, N((a, b), \epsilon) \not\subset B$   
 $\iff \exists (a, b) \in B, s.t. \forall \epsilon > 0, \exists (c, d) \in N((a, b), \epsilon), s.t. (c, d) \notin B$   
 $(1, 0) \in B$  であるが  $\forall \epsilon > 0, N((1, 0), \epsilon) \not\subset B$  である

(4)

$$B^i = \emptyset, \overline{B} = \{(x, 0) \mid x \geq 0\}$$

### 2.2

$$\mathbb{Q}^i = \emptyset, \overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$$

証明は稠密性から自明

### 2.3

(1)

$f \in \overline{A}$  とする. このとき  $\forall \epsilon > 0, N(f, \epsilon) \cap A \neq \emptyset$ 、よって  $\exists g \in N(f, \epsilon) \cap A$  であり、 $g \in A$  で  $d_\infty(f, g) < \epsilon$ . このとき  $f(x) = g(x) + (f(x) - g(x)) \geq g(x) - \sup_{x \in [0, 1]} |f(x) - g(x)|$ . 両辺に

$[0, 1]$  の最小値をとると  $\min_x f(x) \geq \min_x g(x) - \sup |f(x) - g(x)| \geq -\epsilon$ .  $\epsilon > 0$  の任意性より、 $\min f(x) \geq 0$ 、 $\therefore f \in A$

(2)

$f \in B$  とすると、 $\exists c > 0, s.t. \min f(x) = c$ . このとき、 $g \in N\left(f, \frac{c}{2}\right)$  とすれば  $x \in [0, 1], g(x) \geq f(x) + (g(x) - f(x)) \geq f(x) - \sup |f(x) - g(x)|$   
 $\min g(x) \geq \min f(x) - \sup |f(x) - g(x)| > c - \frac{1}{2}c = \frac{1}{2}c > 0$ 、よって  $g \in B, N\left(f, \frac{1}{2}c\right) \subset B$

### 2.4

(1)

定義より  $\emptyset, X \in \mathcal{O}_d$

(2)

$O_1, O_2, \dots, O_n \in \mathcal{O}_d$  とする.  $\bigcap_{k=1}^n O_k = \emptyset$  ならば開集合.  $\bigcap_{k=1}^n O_k \neq \emptyset$  のときは  $x \in \bigcap_{k=1}^n O_k$  とすると、 $\exists \{\epsilon_k\}_{k=1}^n$  : 正の数列、s.t.  $N(x, \epsilon_k) \subset O_k$ . ここで、 $\epsilon_0 := \min \{\epsilon_k : k = 1, 2, \dots, n\}$  とおくと  $N(x, \epsilon_0) \subset \bigcap_{k=1}^n O_k$  となり、 $\bigcap_{k=1}^n O_k \in \mathcal{O}_d$

(3)

$O_\lambda \in \mathcal{O}_d, x \in \bigcup_{\lambda \in \Lambda} O_\lambda$  とすると  $\exists \lambda_0 \in \Lambda, s.t. x \in O_{\lambda_0}$   
 $\exists \epsilon > 0, s.t. N(x, \epsilon) \subset O_{\lambda_0} \subset \bigcup_{\lambda \in \Lambda} O_\lambda$  なので、 $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} O_\lambda$  : 開集合

## 2.5

(1)

$$N(x, \epsilon) = \begin{cases} x & \epsilon > 1 \\ \{x\} & 0 < \epsilon < 1 \end{cases}$$

(2)

$$x \in A \text{ とし } \epsilon = \frac{1}{2} \text{ とすると } N\left(x, \frac{1}{2}\right) = \{x\} \subset A$$

(3)

$x \in \overline{A}$  とする.  $\forall \epsilon > 0, A \cap N(x, \epsilon) \neq \emptyset$ .  $\epsilon = \frac{1}{2}$  とすると、 $N(x, \epsilon) = \{x\} \cap A \neq \emptyset$  より  $x \in A$ . よって、 $A$  は閉集合である

## 2.6

$x \notin A^c \implies x \notin \overline{A^c}$  を示せばいいで  $X \notin \overline{A^c} \iff \exists \epsilon < 0, s.t. N(x, \epsilon) \cap A^c = \emptyset \iff \exists \epsilon > 0, s.t. N(x, \epsilon) \subset A \iff x \in A^i$   
 $\iff x \notin \overline{A^c} \implies x \in A \iff \forall \epsilon > 0, N(x, \epsilon) \cap A \neq \emptyset \implies x \in A \iff \forall \epsilon > 0, N(x, \epsilon) \not\subset A^c \implies x \in A \iff x \notin (A^c)^i \implies x \notin A^c \iff x \in A^c \implies x \in (A^c)^i \iff A^c : open$   
 よって  $A : open \implies A^c : closed$  で逆方向の証明は逆方向であるから略

# 3

## 3.1

(1)  $\Rightarrow$  (2)

(1) は  $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, s.t. x \in X, d_X(x, a) < \delta \Rightarrow d_Y(f(x), f(a)) < \epsilon$   
 よって、 $x \in N(a, \delta) \Rightarrow f(x) \in N(f(a), \epsilon) \Leftrightarrow x \in f^{-1}(N(f(a), \epsilon))$   
 $\therefore N(a, \delta) \subset f^{-1}(N(f(a), \epsilon))$

(2)  $\Rightarrow$  (3)

$d_Y(f(a), f(a)) = 0 < \epsilon$  より、 $a \in f^{-1}(N_Y(f(a), \epsilon))$  であり、(2) から、 $\exists \delta > 0, s.t. N_X(a, \delta) \subset f^{-1}(N_Y(f(a), \epsilon))$ 、 $\therefore a$  は  $f^{-1}(N_Y(f(a), \epsilon))$  の内点

(3)  $\Rightarrow$  (4)

$M \in N_Y(f(a))$  とすると  $\exists \epsilon > 0, N_Y(f(a), \epsilon) \subset M$ . このとき、 $f^{-1}(N_Y(f(a), \epsilon)) \subset f^{-1}(M)^i$ 、  
 (3) から  $a \in f^{-1}(N_Y(f(a), \epsilon))$  なので、 $a \in f^{-1}(M)^i, f^{-1}(M) \in N_X(a)$

(4)  $\Rightarrow$  (1)

$f(a) \in N_Y(f(a), \epsilon)^i = N_Y(f(a), \epsilon)$  より、 $N_Y(f(a), \epsilon) \in N_Y(f(a))$  なので (4) より  $f^{-1}(N_Y(f(a), \epsilon)) \in N_X(a)$ . つまり  $a \in f^{-1}(N_Y(f(a), \epsilon))$

## 3.2

(1)  $\Rightarrow$  (2)

$A \subset X, b \in f(\overline{A})$  とすると  $\exists a \in \overline{A}, s.t. b = f(a), \forall \epsilon > 0, N_Y(a, \epsilon) \cap A \neq \emptyset$ 、(1) から  $f$  は  $x = a$  で連続なので、3.2 の (2) より  $N(a, \epsilon) \subset f^{-1}(N_Y(f(a), \epsilon))$  なので  $f^{-1}(N_Y(b, \epsilon)) \cap A \neq \emptyset$ 、  
 したがって、 $x \in f^{-1}(N_Y(b, \epsilon)) \cap A$  とすると  $f(x) \in N_Y(b, \epsilon)$ かつ  $x \in A$ . したがって、  
 $N_Y(b, \epsilon) \cap f(A) \neq \emptyset, \therefore \emptyset \in \overline{f(A)}$

(2)  $\Rightarrow$  (1)

$Y \supset F : closed$  とおくと、 $f^{-1}(Y) \subset X$  なので (2) から  $f\left(\overline{f^{-1}(Y)}\right) \subset \overline{f(f^{-1}(F))} = \overline{F} = F$ .

したがって、 $\overline{f^{-1}(F)} \subset f^{-1}(F)$  となり、 $f^{-1}(F)$  は閉である. 以下は  $f$  の連続性を示す

$O \subset Y, O : open$  とし、2.6 から  $O^c : closed$  なので  $f^{-1}(O^c)$  は閉で、 $f^{-1}(O^c) = \{x \in X | f(x) \in O^c\} = \{x \in X | f(x) \in O\}^c = \{f^{-1}(O)\}^c$ . よって  $\{f^{-1}(O)\}^c$  は閉で  $f^{-1}(O)$  は開であるから  $f$  は連続である

### 3.3

(1)

$d_\infty(f, f_0) < \delta, G = \int_0^1 g(t) dt$  とすると  $\delta := \frac{\epsilon}{G}$  とすれば

$$\begin{aligned} |l_g(f) - l_g(f_0)| &= \left| \int_0^1 f(t) g(t) dt - \int_0^1 f_0(t) g(t) dt \right| \\ &= \left| \int_0^1 (f(t) - f_0(t)) g(t) dt \right| \\ &\leq \int_0^1 |f(t) - f_0(t)| g(t) dt \\ &\leq \int_0^1 \sup_{t \in [0,1]} |f(t) - f_0(t)| g(t) dt \\ &\leq \int_0^1 \delta g(t) dt < \epsilon \end{aligned}$$

(2)

$d_\infty(f, g) < \delta := \epsilon$  とすれば

$$\begin{aligned} d_\infty(T(f), T(g)) &= \sup_{x \in [0,1]} \left| \int_0^x (f(t) - g(t)) dt \right| \\ &\leq \sup_{x \in [0,1]} \int_0^x |f(t) - g(t)| dt \\ &\leq \int_0^x \|f - g\|_\infty dt = x \cdot \|f - g\|_\infty \\ &\leq \|f - g\|_\infty = d_\infty(f, g) < \epsilon \end{aligned}$$

(3)

$M := \max\{f(t), g(t)\}, \delta := \frac{\epsilon}{2M+1}$  とすれば

$$\begin{aligned} d_\infty(D(f), D(g)) &= \sup_{x \in [0,1]} \left| f(0) - g(0) + \int_0^x f(t)^2 dt - \int_0^x g(t)^2 dt \right| \\ &\leq \sup_{x \in [0,1]} |f(0) - g(0)| + \sup_{x \in [0,1]} \left| \int_0^x f(t)^2 dt - \int_0^x g(t)^2 dt \right| \\ &\leq \sup_{x \in [0,1]} |f(x) - g(x)| + \sup_{x \in [0,1]} |f(x) - g(x)| \cdot \sup_{x \in [0,1]} \left| \int_0^x f(t) + g(t) dt \right| \\ &< \delta + \delta \cdot 2M = (2M+1)\delta < \epsilon \end{aligned}$$

### 3.4

(1)

$f : X \rightarrow Y$  が Lipschitz 連続であるから、 $\exists k, s.t. \forall a, b \in X, d_Y(f(a), f(b)) \leq Kd_X(a, b)$ . ここで  $d_X(a, b) < \delta := \frac{\epsilon}{K}$  とすると、 $d_Y(f(a), f(b)) \leq Kd_X(a, b) < K\frac{\epsilon}{K} = \epsilon$  だから、 $f$  は一様連続

(2)

$f$  は一様連続であるから、 $\forall x, y \in X, \exists \delta, s.t. \forall d_X(x, y) < \delta \implies d_Y(f(x), f(y)) < \epsilon$ . 言い換れば  $y = x_0$  を固定すれば任意の  $x_0 \in X$  に対して連続であり、 $x_0$  の任意性より  $f$  は連続である

## 4

### 4.1

$\subset$

$x \in \{x \in X | \forall O \in \mathcal{O}, [x \in O \Rightarrow O \cap A \neq \emptyset]\}$  とする。 $F \in \mathcal{F}$  に対し、 $F^c \in \mathcal{O}$  となるから、 $\exists O \in \mathcal{O}, s.t. F^c = O \in \mathcal{O}, x \in O \Rightarrow O \cap A \neq \emptyset$  より  $x \in F^c \Rightarrow F^c \cap A \neq \emptyset$  があるので、この対偶をとると  $F^c \cap A = \emptyset \Rightarrow x \notin F^c$  である。 $A \subset F$  のとき、 $F^c \cap A = \emptyset$  なので、 $x \notin F^c \Leftrightarrow x \in F$ 。よって  $\forall F \in \mathcal{F}, A \subset F, x \notin F^c \Rightarrow x \in F$  より  $x \in \bigcap \{F \in \mathcal{F} | A \subset F\}$

$\supset$

$x \in \bigcap \{F \in \mathcal{F} | A \subset F\}$  とする、 $O \in \mathcal{O}$  に対し、 $O^c \in \mathcal{F}$  なので  $A \subset O^c \Rightarrow x \in O^c$  である。したがって、 $A \cap O = \emptyset \Rightarrow A \subset O^c \Rightarrow x \in O^c$ 。これの対偶から  $x \in O \Rightarrow A \cap O \neq \emptyset$

### 4.2

$$\begin{cases} \mathcal{O}_1 = \{\emptyset, X\} \\ \mathcal{O}_2 = \{\emptyset, \{1\}, X\} \\ \mathcal{O}_3 = \{\emptyset, \{2\}, X\} \\ \mathcal{O}_4 = \mathcal{P}(X) \end{cases}$$

### 4.3

(1)

$X \notin \mathcal{O}_1, \emptyset \notin \mathcal{O}_2$  から、 $(O_1)$  が満たされていない  
 $\{1, 2\} \cap \{2, 3\} = \{2\} \notin \mathcal{O}_3$  から、 $(O_2)$  が満たされていない  
 $\{1\} \cup \{2\} = \{1, 2\} \notin \mathcal{O}_4$  から、 $(O_3)$  が満たされていない

(2)

$$\begin{cases} \tilde{\mathcal{O}}_1 = \mathcal{O}_1 \cup X \\ \tilde{\mathcal{O}}_2 = \mathcal{O}_2 \cup \emptyset \\ \tilde{\mathcal{O}}_3 = \mathcal{O}_3 \cup \{2\} \\ \tilde{\mathcal{O}}_4 = \mathcal{O}_4 \cup \{1, 2\} \end{cases}$$

### 4.4

(1)

$\mathcal{O}_1$

(O1)  $\emptyset, \mathbb{R} \in \mathcal{O}_1$

(O2)  $\forall O_1, O_2 \in \mathcal{O}_1, O_1, O_2 \in \{\emptyset, \mathbb{R}\}$  のとき自明であるから、任意の  $O_1, O_2$  に対して  $O_1, O_2 \notin \{\emptyset, \mathbb{R}\}$  とする。 $O_1 := (-\infty, a_1), O_2 := (-\infty, a_2)$  とし、対称性より  $a_1 \leq a_2$  とすると、 $O_1 \cap O_2 = O_1 \in \mathcal{O}_1$

(O3)  $(-\infty, a_i) \in \mathcal{O}_1, i \in I$  とすると、 $\bigcup_{i \in I} (-\infty, a_i) = \left( -\infty, \max_{i \in I} \{a_i\} \right) \in \mathcal{O}_1$

$\mathcal{O}_2$

( $O_1$ )  $\emptyset, \mathbb{R} \in \mathcal{O}_2$

( $O_1$ )  $\forall O_1, O_2 \in \mathcal{O}_2, O_1 := [-n_1, n_1], [-n_2, n_2]$  とし、対称性より  $n_1 \leq n_2$  とする  $O_1 \cap O_2 = O_1 \in \mathcal{O}_2$

( $O_1$ )  $[-n_i, n_i] \in \mathcal{O}_2, i \in I$  とすると

$$\bigcup_{i \in I} [-n_i, n_i] = \left[ -\max_{i \in I} \{n_i\}, \max_{i \in I} \{n_i\} \right] = \begin{cases} \mathbb{R} & \max_{i \in I} \{n_i\} = \infty \\ \left[ -\max_{i \in I} \{n_i\}, \max_{i \in I} \{n_i\} \right] & \max_{i \in I} \{n_i\} < \infty \end{cases}$$

から  $\bigcup_{i \in I} [-n_i, n_i] \in \mathcal{O}_2$

(2)

$$\mathcal{F}_1 = \{O^c | O \in \mathcal{O}_1\} = \{[a, +\infty) | a \in \mathbb{R}\} \cup \{\mathbb{R}, \emptyset\}$$

$$\mathcal{F}_2 = \{O^c | O \in \mathcal{O}_2\} = \{(-\infty, -n) \cup (n, \infty) | n \in \mathbb{N}\} \cup \{\mathbb{R}, \emptyset\}$$

(3)

$A_1^i = \bigcup \{O \in \mathcal{O}_1 | O \subset A_1\}$  であるが、これをみたす  $O \in \mathcal{O}_1$  は存在しないから、 $A_1^i = \emptyset$

$$\overline{A}_1 = \bigcap \{F \in \mathcal{F}_1 | A_1 \subset F\} = [-3, +\infty)$$

$$A_2^i = \bigcup \{O \in \mathcal{O}_2 | O \subset A_2\} = \emptyset$$

$$\overline{A}_2 = \bigcap \{F \in \mathcal{F}_2 | A_2 \subset F\} = (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$$

(4)

$$B_1^i = \bigcup \{O \in \mathcal{O}_1 | O \subset B_1\} = \emptyset$$

$$\overline{B}_1 = \bigcap \{F \in \mathcal{F}_1 | B_1 \subset F\} = [-3, +\infty]$$

$$B_2^i = \bigcup \{O \in \mathcal{O}_2 | O \subset B_2\} = [-1, 1]$$

$$\overline{B}_2 = \bigcap \{F \in \mathcal{F}_2 | B_2 \subset F\} = \emptyset$$

## 4.5

(1)

$$A^i = \bigcup \{O \in \mathcal{O} | O \subset A\} \Leftrightarrow \forall O \in A^i, O \subset A \text{ から } A^i \subset A$$

(2)

$$A^i = \bigcup \{O \in \mathcal{O} | O \subset A\} = \bigcup_{O \in \mathcal{O}} O \text{ から } A^i \subset \mathcal{O}$$

(3)

$A \in \mathcal{O}$  から  $A \subseteq A$  より  $A \subset A^i$

$A \subset A^i$  と仮定すると、 $A \subset A$ かつ  $A \in \mathcal{O}$

以上より、 $A \in \mathcal{O} \Leftrightarrow A \subset A^i$

## 4.6

(1)

$$\overline{A} = \bigcap \{F \in \mathcal{F} | A \subset F\} \Leftrightarrow A \subset A \text{ から } A \subset \overline{A}$$

(2)

$$\overline{A} = \bigcap \{F \in \mathcal{F} | A \subset F\} = \bigcap_{F \in \mathcal{F}} F \text{ から } \overline{A} \in \mathcal{F}$$

(3)

$$\begin{aligned} A \in \mathcal{F} \text{ と仮定すると } A \subseteq A \text{ から } \overline{A} \subseteq A \\ \overline{A} \subset A \text{ と仮定すると } \bigcap \{F \in \mathcal{F} | A \subset F\} \subset A \text{ から } A \subset A \text{ より } A \in \mathcal{F} \end{aligned}$$

## 4.7

$$(O1) \emptyset, A \in \mathcal{O} \text{ から } \emptyset, A \in \mathcal{O}_A$$

$$(O2) \forall O_1, O_2 \in \mathcal{O}_A, O_1, O_2 \subset A \text{ で } O_1 \cap O_2 \subset A \text{ から } O_1 \cap O_2 \in \mathcal{O}_A$$

$$(O3) \forall i \in I, O_i \in \mathcal{O}_A \text{ とすると } \bigcup_{i \in I} O_i \subset A \text{ であるから } \bigcup_{i \in I} O_i \in \mathcal{O}_A$$

## 5

### 5.1

$$(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (4) \Rightarrow (3) \Rightarrow (1)$$

$$(1 \Rightarrow 2)$$

$p \in X, N \in \mathcal{N}_Y(f(p))$  とすると  $f(p) \in N^i$   
 $\exists O \in \mathcal{O}_Y, s.t. f(p) \in O \subset N$   
 よって、 $p \in f^{-1}(O)$  となるが、(1) より  $f^{-1}(O) \in \mathcal{O}_X$  なので  
 $(O \subset N) \Rightarrow f^{-1}(O)^i \subset f^{-1}(N)^i$   
 したがって、 $p \in f^{-1}(O) \stackrel{\text{open}}{\equiv} f^{-1}(O)^i \subset f^{-1}(N)^i$   
 $\therefore f^{-1}(N) \in \mathcal{N}_X(p)$

$$(2 \Rightarrow 4)$$

$S \subset X, y \in f(\overline{S})$  とする。 $\exists p \in \overline{S}, s.t. y = f(p)$  である。 $O \in \mathcal{O}_Y, y = f(p) \in O (= O^i)$  とすると  
 (2) から  $p \in f^{-1}(O)^i$   
 $p \in \overline{S}$  なので、 $\forall O' \in \mathcal{O}_X$  に対し、 $p \in O' \Rightarrow O' \cap S \neq \emptyset$  より  $f^{-1}(O)^i \cap S \neq \emptyset$   
 $x \in f^{-1}(O)^i \cap S$  とすると、 $f(f^{-1}(O)^i) \subset O$  から  $f(x) \in O \cap f(S)$

$$(4 \Rightarrow 3)$$

$F \in \mathcal{F}_Y$  とする。(4) から  $f^{-1}(F) \subset X$  に対し、 $f\left(\overline{f^{-1}(F)}\right) \stackrel{(4)}{\subset} \overline{f(f^{-1}(F))} \subset \overline{F} = F$  なので  
 $\overline{f^{-1}(F)} \subset f^{-1}\left(f\left(\overline{f^{-1}(F)}\right)\right) \subset f^{-1}(F)$

$$(3 \Rightarrow 1)$$

$O \in \mathcal{O}_Y$  とすると、 $O^c \in \mathcal{F}_Y$  なので、(3) から  $f^{-1}(O^c) \in \mathcal{F}_Y$ .  
 $\therefore f^{-1}(O) = f^{-1}(O^c)^c = \mathcal{O}_X$

### 5.2

#### (1)

$O \in \mathcal{O}_Y$  とすると  $f^{-1}(O) \in \mathcal{P}(X) = \mathcal{O}_X$

#### (2)

$$\begin{cases} \phi = \mathcal{O}_Y \\ Y = \mathcal{O}_Y \end{cases} \text{ とすると } \begin{cases} f^{-1}(\phi) = \phi \in \mathcal{O}_X \\ f^{-1}(Y) = X \in \mathcal{O}_X \end{cases}$$

### 5.3

$O \in \mathcal{O}_Y$  とすると、 $y_0 \in O \Rightarrow f^{-1}(O) = X = \mathcal{O}_X, y_0 \notin O \Rightarrow f^{-1}(O) = \emptyset \in \mathcal{O}_X$

## 5.4

$O \in \mathcal{O}_z$  とする.  $g : \text{連続}$

$g^{-1}(O)$  は開で、 $f : \text{連続}$

$f^{-1}(g^{-1}(O))$  : 開

$$(g \circ f)^{-1}(O) = f^{-1}(g^{-1}(O)) \in \mathcal{O}_X$$

$\therefore g \circ f$  連続

## 5.5

### (1)

$|f| : X \rightarrow \mathbb{R}$  を  $|\cdot| : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  の合成で  $|\cdot| \circ f = |f|$  と考える

$\forall a \in \mathbb{R}, \forall \epsilon > 0, \delta := \epsilon$  とすると

$$|x - a| < \delta \implies ||a| - |x|| \leq |x - a| < \delta = \epsilon$$

### (2)

$\max : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  として、 $f_+ = \max \circ f$  と考える

$$\forall a \in \mathbb{R}, \forall \epsilon > 0, \delta := \begin{cases} \epsilon & a = 0 \\ \min \left\{ \frac{|a|}{2}, \epsilon \right\} & a \neq 0 \end{cases} \text{ とすると}$$

$$|x - a| < \delta \implies |\max \{x, 0\} - \max \{a, 0\}| < \epsilon$$

## 5.6

### (1)

(O1)  $\emptyset, X \in \mathcal{O}_X$  は自明

(O2)  $\forall O_1, O_2 \in \mathcal{O}_X$  とすると、 $O_1 \cap O_2 \subset X$  から  $O_1 \cap O_2 \in \mathcal{O}_X$

(O3)  $\forall i \in I, O_i \in \mathcal{O}_X$  とすると、 $\bigcup_{i \in I} O_i \subset X$  から  $\bigcup_{i \in I} O_i \in \mathcal{O}_X$

### (2)

$$\mathcal{O}_Y = \{\emptyset, \{b\}, \{a, b\}, Y\}$$

### (3)

$$\mathcal{O}_Y = \{\emptyset, \{a\}, \{c\}, \{a, c\}, \{a, b\}, Y\}$$

## 5.7

1.  $id : X \rightarrow X$  より  $X \simeq X$

2.  $X \simeq Y$  とすると  $\exists f : X \rightarrow Y$  は同相写像であり、 $f$  の逆写像  $f^{-1}$  も同相写像であるから  $f^{-1} : Y \rightarrow X$  より  $Y \simeq X$

3.  $X \simeq Y, Y \simeq Z$  とすると  $\exists f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z$  は同相写像で、これらの逆写像  $f^{-1} : Y \rightarrow X, g^{-1} : Z \rightarrow Y$  も存在するから、 $\exists h^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$  も同相写像だから  $X \simeq Z$

## 5.8

(1) ~ (4)

$$f(x) = \frac{d-c}{b-a}(x-a) + c$$

(5)

$$\begin{aligned} f(x) &= 1-x, [0, 1] \simeq (0, 1] \\ f(x) &= \log x, (0, 1] \simeq (-\infty, 1] \end{aligned}$$

(6)

$$f(x) = \tan x$$

## 5.9

(1)

$f(\theta) := (\cos \theta, \sin \theta) \in \mathbb{S}^1$  は連続で

$$g(x, y) := \begin{cases} \arccos x & y \geq 0 \\ 2\pi - \arccos x & y < 0 \end{cases} \text{ とおくと、 } f \circ g = g \circ f = id \text{ で } g \text{ は連続}$$

(2)

( $\mathbb{R} \not\simeq \mathbb{S}^1$  を示す)

$f : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{R}$  : 連続、全単射 が存在すると仮定する

ここで  $g : [0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{S}^1$  を  $g(0) := (\cos \theta, \sin \theta)$  とおくと、 $g$  は連続 全単射になる  
( $g^{-1}$  は連続にならない)

したがって、 $f \circ g : [0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}$  も連続 全単射

よって、 $f \circ g$  は単調増加としてよい。そこで  $f \circ g(0) =: \alpha$  とおくと  $f \circ g(x) \geq \alpha, \forall x \in [0, 2\pi)$   
であるが、これは  $f \circ g$  全射であることと矛盾

$f$  : 連続 全単射となるものは存在しない

## 6

### 6.1

$$\mathcal{O}_{\mathbb{Z}} = \{U \cap \mathbb{Z} \mid U \in \mathcal{O}_{\mathbb{R}}\}$$

(1)

$$x \in \mathbb{Z} \text{ のとき、 } \{x\} = \left( x - \frac{1}{2}, x + \frac{1}{2} \right) \cap \mathbb{Z} \therefore \{x\} \in \mathcal{O}_{\mathbb{Z}}$$

次  $\mathcal{O}_{\mathbb{Z}} \subset \mathcal{P}(\mathbb{Z})$  は明らか、 $A \in \mathcal{P}(\mathbb{Z})$  とすると、 $A = \bigcup_{x \in A} \{x\}$  であるが、 $\{x\} \in \mathcal{O}_{\mathbb{Z}}$  と (O3) から  
 $A \in \mathcal{O}_{\mathbb{Z}}$

(2)

$$\mathcal{O}_{\mathbb{Q}} = \{U \cap \mathbb{Q} \mid U \in \mathcal{O}_{\mathbb{R}}, x \in \mathbb{Q}\}$$

$$\{x\} \text{ が } \mathbb{Q} \text{ の開集合でない} \iff \neg(x \text{ が } \mathbb{Q} \text{ の開集合}) \iff \neg(\exists U \in \mathcal{O}_{\mathbb{R}}, \{x\} = U \cap \mathbb{Q})$$

$$\iff \forall U \in \mathcal{O}_{\mathbb{R}}, \{x\} \neq U \cap \mathbb{Q}$$

$U \in \mathcal{O}_{\mathbb{R}}$  を任意にとる、 $x \notin U$  のとき、 $\{x\} \neq U \cap \mathbb{Q}$  は自明なので、 $x \in U$  とする

$$\exists \epsilon > 0, s.t. (x - \epsilon, x + \epsilon) \subset U$$

ここで、有理数の稠密性から  $\exists y \in \mathbb{Q}, s.t. y \in (x, x + \epsilon)$

$$\text{このとき、} x < y \in U \cap \mathbb{Q}, \{x\} \neq \{y\} \subset U \cap \mathbb{Q}$$

## 6.2

$$X = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$$

(1)

$(0, 1) = (0, 1) \cap X, (0, 1) = [0, 1] \cap X$  とかけるので、(0.1) は開かつ閉集合

(2)

$$\left[ \frac{1}{2}, \frac{3}{2} \right]_X := \left[ \frac{1}{2}, \frac{3}{2} \right] \setminus \{1\}, \left[ \frac{1}{2}, \frac{3}{2} \right]_X = \left[ \frac{1}{2}, \frac{3}{2} \right] \cap X \text{ より閉集合であるが開集合ではない.}$$

( $\because$ )

$$\left[ \frac{1}{2}, \frac{3}{2} \right]_X \text{ が } X \text{ の開集合でない} \iff \forall U \in \mathcal{O}_{\mathbb{R}}, \left[ \frac{1}{2}, \frac{3}{2} \right]_X \neq U \cap X$$

$$\left[ \frac{1}{2}, \frac{3}{2} \right]_X \notin \mathcal{O}_{\mathbb{R}} \text{ なので、} U \supset \left[ \frac{1}{2}, \frac{3}{2} \right]_X \text{ となる } U \text{ を考える.}$$

$$\frac{1}{2} \in \left[ \frac{1}{2}, \frac{3}{2} \right]_X \text{ であるから、} \exists \epsilon > 0, s.t. \left( \frac{1}{2} - \epsilon, \frac{1}{2} + \epsilon \right) \subset U$$

$$\text{ここで } y := \frac{1}{2} - \min \left\{ \frac{\epsilon}{2}, \frac{1}{4} \right\} \text{ とおくと } y \in U \cap X \text{ かつ } y < \frac{1}{2} \text{ なので、} \left[ \frac{1}{2}, \frac{3}{2} \right]_X \neq U \cap X$$

## 6.3

(1)

$$\begin{cases} A = (-\infty, 3) \cap X \\ B = (-2, 0) \cap X \\ C = (0.9, 2) \cap X \\ D = (2.9, \infty) \cap X \end{cases}$$

(2)

$$\begin{cases} A = (-\infty, 3] \cap X \\ B = [-2, 0] \cap X \\ C = [1, 2] \cap X \\ D = [3, \infty) \cap X \end{cases}$$

(3)

$$[-3, 3] \cap X = (-2, 0) \cup [1, 2] \cup \{3\}$$

(4)

$$\overline{N_X(0, 3)} = (-3, 3) \cap X = B \cup C$$

## 6.4

$$B = ((0, \infty)_x \times \mathbb{R}_y) \cap X \text{ より開}$$

## 7

## 7.1

$(O1)$  の成立は自明であって  $(O2)$  は  $0 < a_1 \leq a_2$  とすると  $[-a_1, a_1] \subset [-a_2, a_2]$  があるから  $[-a_1, a_1] \cap [-a_2, a_2] = [-a_1, a_2]$  より  $\forall B_1, B_2 \in \mathcal{B}, B_1 \cap B_2 \in \mathcal{B}$ . ここで  $B_n = \left[-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right], n \in \mathbb{N}$  とすると、 $\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n = (-1, 1) \notin \mathcal{B}$  から  $(O3)$  をみたさない

$\mathcal{B} = \{[-a, a] \subset \mathbb{R} | a \geq 0\}$  から  $a \rightarrow \infty$  とすると  $\mathcal{B} = \mathbb{R}$  から、 $\mathbb{R} = \bigcup \mathcal{B}$ . 任意に  $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$  を取り、 $B_1, B_2 \in \{\emptyset, \mathbb{R}\}$  のときは自明であるから、 $B_1, B_2 \notin \{\emptyset, \mathbb{R}\}$  とする. 対称性より  $B_1 \subset B_2$  を仮定すると  $x \in B_1 \cap B_2 \iff x \in B_1$  に対し、 $B = B_1$  に対して  $B \subset B_1 \cap B_2$  で  $x \in B$ . 以上より、 $\mathcal{B}$  は開基の公理をみたす

## 7.2

$$\begin{aligned}\mathcal{B}_{\mathcal{S}} &= \{\bigcap \mathcal{U} | \mathcal{U} \subset \mathcal{S}\} = \{\emptyset, \{1, 2\}, \{2, 3\}, \{2\}, \{4\}, X\} \\ \mathcal{O}_{\mathcal{S}} &= \mathcal{O}_{\mathcal{B}_{\mathcal{S}}} = \{\bigcup \mathcal{U} | \mathcal{U} \subset \mathcal{B}_{\mathcal{S}}\} = \{\emptyset, \{1, 2\}, \{2, 3\}, \{2\}, \{4\}, \{2, 4\}, \{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \{2, 3, 4\}, X\}\end{aligned}$$

## 7.3

## (1)

$O \in \mathcal{O}_d$  をとると  $x \in O$  のとき  $\exists \epsilon > 0, s.t. N(x, \epsilon) \subset O$  となり、 $\epsilon_1 < \epsilon_2$  とし  $\forall B_1 = \{N(x, \epsilon_1)\}, B_2 = \{N(x, \epsilon_2)\} \in \mathcal{B}, x \in B_1 \cap B_2$  とすると  $B_1 \cap B_2 = B_1$  から  $x \in B_1 \in \mathcal{B}$ . よって  $\mathcal{B}$  は開基である

## (2)

1.  $X = \bigcup_{r>0} N(a, r)$
2.  $B_1 := N(a, r_1), B_2 := N(a, r_2), r_1 \leq r_2$  とし  $B_1 \cap B_2 = B_1$  となり、 $x \in B_1 \cap B_2 = B_1$  に対して  $x \in B_1 \in \mathcal{B}$

から、 $\mathcal{B}_a$  は開基の公理をみたすが  $d$  が離散距離の場合で、 $N\left(a, \frac{1}{2}\right) = \{a\} \in \mathcal{O}_d$  であるが  $\{a\} \neq X = \bigcup_{r>0} N(a, r)$  となるから  $\mathcal{B}_a$  は  $\mathcal{O}_d$  の開基とならない

## (3)

$\left(x - \frac{1}{2}, x + \frac{1}{2}\right) \in \mathcal{O}_{\mathbb{R}}$  であるが  $\left(x - \frac{1}{2}, x + \frac{1}{2}\right) \subsetneq \bigcup_{x \in \mathbb{R}} N(x, 1)$  から、開基ではない  
 $O \in \mathcal{O}_{\mathbb{R}}$  とすると  $\forall x \in O, \exists \epsilon > 0, s.t. (x - \epsilon, x + \epsilon) \subset O$  となる.  $\epsilon \geq 1$  のとき  $x \in N(x, 1) \subset N(x, \epsilon)$  があるから、 $x \in \bigcap_{B \in \mathcal{B}_0} \bigcap_{B \in \mathcal{B}_0} \subset \mathcal{O}_d$ . 以上より  $\mathcal{B}_0$  は  $\mathcal{O}_d$  の準開基である  
 $\epsilon < 1$  では  $U_1 := N\left(x - \frac{\epsilon}{2} + 1, 1\right), U_2 := N\left(x + \frac{\epsilon}{2} - 1, 1\right) \in \mathcal{B}_0$  とおくと  $\forall x \in O \in \mathcal{O}_{\mathbb{R}}, x \in U_1 \cap U_2 = \left(x - \frac{\epsilon}{2}, x + \frac{\epsilon}{2}\right) \subset N(x, \epsilon) \subset O$  から、 $\mathcal{B}_0$  は  $\mathcal{O}_d$  の準開基である

## 7.4

開基であると仮定すると  $\forall O := N((x, y), \epsilon) \in \mathcal{O}_d, \exists \mathcal{S}_0 \in \mathcal{S}, s.t. N((x, y), \epsilon) = \bigcup_{S \in \mathcal{S}_0} S$  であるが、  
 $N((0, 0), 1)$  に対して、任意の  $S \in \mathcal{S}$  は第一または第三象限しか被覆しないから  $\mathcal{S}$  は開基ではない

$\forall O = N((x_0, y_0), \sqrt{2}r) \in \mathcal{O}_d, \forall (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2, U_1 := \{(x, y) : x > x_0 - r, y > y_0 - r\} \in \mathcal{S}_1 \subset \mathcal{S}$   
 $U_2 := \{(x, y) : x < x_0 + r, y < y_0 + r\} \in \mathcal{S}_1 \subset \mathcal{S}$  とする  $(x_0, y_0) \in U_1 \cap U_2 \not\Rightarrow U_1 \cap U_2 \subset O = N((x_0, y_0), \sqrt{2}r)$

**8****8.1****8.2****8.3****8.4****8.5****8.6**

$U, V \in \mathcal{O}$  に対し

(1)

$x \in U \cap V$  のとき、 $\Delta^{-1}(U \times V) = X \in \mathcal{O}$

(2)

$x \notin U \cap V$  のとき、 $\Delta^{-1}(U \times V) = \emptyset \in \mathcal{O}$

**8.7**

$O_1 \in \mathcal{O}_{Y_1}, O_2 \in \mathcal{O}_{Y_2}$  に対し、仮定から  $f_1^{-1}(O_1) \in \mathcal{O}_X, f_2^{-1}(O_2) \in \mathcal{O}_X$  なので、 $f^{-1}(O_1 \times O_2) = f_1^{-1}(O_1) \cap f_2^{-1}(O_2) \in \mathcal{O}_X$

**8.8**

Annulus (円環)

$$\begin{aligned}\phi : \mathbb{S}^1 \times (0, 1) &\rightarrow A \\ (\cos \theta, \sin \theta, r) &\mapsto ((1+r) \cos \theta, (1+r) \sin \theta)\end{aligned}$$

とすると、 $\phi$ ：全単射、連続、 $\phi^{-1}$ ：連続

$$\left( \phi^{-1}(u, v) = \left( \frac{u}{\sqrt{u^2 + v^2}}, \frac{v}{\sqrt{u^2 + v^2}}, \sqrt{u^2 + v^2} - 1 \right) \right)$$

**8.9**

Torus (トーラス)

$$\begin{aligned}\phi : \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1 &\rightarrow \Pi \\ (\cos \theta, \sin \theta, \cos \eta, \sin \eta) &\mapsto ((2 + \cos \eta) \cos \theta, (2 + \cos \eta) \sin \theta, \sin \eta)\end{aligned}$$

$$\phi : \text{全単射} \quad \phi, \phi^{-1} : \text{連続} \quad \left( \phi^{-1}(x, y, z) = \left( \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \sqrt{x^2 + y^2} - 2, z \right) \right)$$

# 9

## 9.1

(1)

$$x - (x - [x]) = [x] \in \mathbb{Z}$$

$$\therefore x \sim x - [x]$$

(2)

$f(x)$  は  $x$  の式と定めると、必ず  $x$  を与えたとき  $f(x)$  が一つ定まる。今回は  $\tilde{f}(C) := f(x)$ 、右辺に  $C$  がない  $\rightarrow$  一つに定まるかわからない。 $x, y \in C$  としたときに  $f(x) = f(y)$  となれば代表元の取り方に依らない

$x, y \in C$  とする、 $x \sim y$  なので、 $x - y \in \mathbb{Z}$

$$\begin{aligned} f(x) &= (\cos(2\pi x), \sin(2\pi x)) \\ &= (\cos(2\pi y + 2\pi(x - y)), \sin(2\pi y + 2\pi(x - y))) \\ &= (\cos(2\pi y), \sin(2\pi y)) \\ &= f(y) \end{aligned}$$

(3)

$\tilde{f}$ ：連続は明らか

$$g(x, y) := \begin{cases} C\left(\frac{1}{2\pi} \arccos x\right) & y \geq 0 \\ C\left(-\frac{1}{2\pi} \arccos x\right) & y < 0 \end{cases}$$

とおくと、 $g \circ f \tilde{f} = \tilde{f} \circ g = id$  で、 $\tilde{f}$  は全単射であり、  
 $g = \tilde{f}^{-1}$  は連続

## 9.2

(1)

$$\tilde{f} : X / \sim \rightarrow \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$$

$$\begin{aligned} \underline{f}(x, y) &:= (\cos 2\pi x, \sin 2\pi x, \cos 2\pi y, \sin 2\pi y) \\ \tilde{f} \text{ を } 9-1 \text{ と同様に } \tilde{f}(C) &:= f(x, y) \text{ と定める} \end{aligned}$$

(2)

$f(x, y)$  は (1) と同様で  $\tilde{f}(C) = f(x, y)$  とおけばいい

(3)

5-9 と同様

## 9.3

$Y := \mathbb{S} \times [0, 1]$  を  $\mathbb{R}^3$  の部分空間とする

$$(x, y, z) \stackrel{Y}{\sim} (x', y', z') \iff \left[ -x = x' \wedge -y = y' \wedge z = z' = \frac{1}{2} \right] \vee ((x, y, z) = (x', y', z')) \text{ とすると、}$$

$X / \sim$  と  $Y / \stackrel{Y}{\sim}$  は同相

---

$\phi(x, y) = \left( \cos 2\pi x, \sin 2\pi y, \frac{1}{2} + \frac{1 - 2y}{2} \sin \pi y \right)$  において、 $\tilde{\phi}(C) := \phi(x, y)$  とおくと、 $\tilde{\phi}$ : 全単射、 $\tilde{\phi}, \tilde{\phi}^{-1}$ : 連続

## 10

### 10.1

(1)

$x, y \in X, x \neq y$  とすると  $\{x\}, \{y\} \in \mathcal{O}$  かつ  $\{x\} \cap \{y\} = \emptyset \therefore X$  : ハウスドルフ

(2)

$x, y \in X, x \neq y$  とする。 $x \in U \in \mathcal{O}$  となるとき  $U = X$ 、 $y \in V \in \mathcal{O}$  となるとき  $V = X$ 、 $U \cap V = X \neq \emptyset$ 。よって  $X$  : ハウスドルフではない

### 10.2

$x, y \in X, x \neq y$  とすると  $\epsilon := \frac{1}{2}d(x, y) > 0$  とおく、 $N(x, \epsilon), N(y, \epsilon) \in \mathcal{O}$  で、 $N(x, \epsilon) \cap N(y, \epsilon) = \emptyset$  であるから、 $X$  はハウスマルクである

### 10.3

$\emptyset \neq U, V \in \mathcal{O}$  とすると、 $U = (-\infty, a), V = (-\infty, b)$  とかける。このとき  $U \cap V = (-\infty, \min\{a, b\}) \neq \emptyset$

### 10.4

$p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}/\sim$  を自然な全射とすると  $p(0) \in U, p(\sqrt{2}) \in V$  であり、 $p$  の連続性から、  
 $0 \in p^{-1}(U) \in \mathcal{O}_{\mathbb{R}}, \sqrt{2} \in p^{-1}(V) \in \mathcal{O}_{\mathbb{R}}$ 。よって、 $\exists \epsilon > 0, s.t. (\sqrt{2} - \epsilon, \sqrt{2} + \epsilon) \subset p^{-1}(V)$   
 ここで、 $\mathbb{Q}$  の稠密性より、 $\exists r \in \mathbb{Q}, s.t. r \in (\sqrt{2} - \epsilon, \sqrt{2} + \epsilon)$ 、したがって、 $r \in \mathbb{Q} \cap p^{-1}(V)$ 。  
 一方、 $r - 0 = r \in \mathbb{Q}$  より、 $r \sim 0$ 、よって、 $p(r) = p(0) \in U$  で  $p(r) \in U \cap V$   
 $\Rightarrow \mathbb{R}/\sim$  : ハウスマルクではない

### 10.5

$K := \{x_n \in x | n = \{1, 2, \dots, N\}\}$  とおく。 $K \subset \bigcup \mathcal{V}$  となる  $\mathcal{V}$  (開被覆) を考えると、各  $n$  で  
 $\exists V_n \in \mathcal{V}, s.t. x_n \in V$  であるので、 $\{V_n\}_{n=1}^N \subset \mathcal{V}$  で  $K \subset \bigcup_{n=1}^N V_n$  となる

### 10.6

$K := \left\{ \left( a, b - \frac{1}{n} \right) : n \in \mathbb{N} \right\}$  とすると、 $(a, b) \subset \bigcup K$  である ( $K$  : 開被覆) が  $\bigcup_{n=1}^N \left( a, b - \frac{1}{n} \right) \subsetneq (a, b)$  であるので、有限部分被覆を持たない

### 10.7

$[a, b]$  の開被覆で有限部分被覆を持たない  $K$  があるとする。このとき  $I_0 := [a, b]$  を半分にした  
 $\left[ a, \frac{1}{2}(a+b) \right]$  と  $\left[ \frac{1}{2}(a+b), b \right]$  の内少なくとも一方は  $K$  の有限部分被覆を持たない。それを  $I_1$   
 とおく。同様に  $I_1$  を半分にして、 $K$  の有限部分被覆を持たない閉区間  $I_1 = [a_2, b_2]$  とおく、これを繰り返していくと、区間縮小法より  $\exists c \in [a, b], s.t. \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = c$  となる。ここで、  
 $c \in [a, b] \subset U$  なので、 $\exists U \in K, s.t. c \in U$ 、ここで  $U$  は開なので、 $\exists \epsilon > 0, [c - \epsilon, c + \epsilon] \subset U$ 。一方

で  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = c$  より、 $\exists N \in \mathbb{N}, s.t. |a_N - c| < \frac{\epsilon}{2}, |b_N - c| < \frac{\epsilon}{2}$  となり、 $I_N = [a_N, b_N] \subset (c - \epsilon, c + \epsilon) \subset U$  で、 $I_N$  が  $K$  の一つの元  $U$  で被覆されているとなり、矛盾

## 10.8

$K := \{N(a, 1) | a \in A\}$  とおくと、 $K$  は  $A$  の開被覆であり、 $A$  はコンパクトより、 $\exists N \in \mathbb{N}, \exists \{a_n\}_{n=1}^N \subset X, s.t. A \subset \bigcup_{n=1}^N N(a_n, 1)$  となる。このとき、 $diam N(a_n, 1) \leq 2$  なので、 $diam(A) \leq \sum_{m=1}^N diam N(a_m, 1) \leq 2N$ 。よって、有界である

$x \in A^c$  とする。ここで  $a \in A$  とすると  $x \neq a$  なので  $d(x, a) > 0$ 。そこで  $\epsilon_{x,a} := \frac{d(x, a)}{2}$  とおくと、 $a \notin N(x, \epsilon_{x,a})$ 。すなわち、 $a \in N(x, \epsilon_{x,a})^c$ 。よって  $K' := \{N(x, \epsilon_{x,a})^c | a \in A\}$  とおくと、 $K'$  は  $A$  の開被覆。よって、 $\exists N \in \mathbb{N}, \exists \{a_n\}_{n=1}^N \subset X, s.t. A \subset \bigcup_{n=1}^N N(x, \epsilon_{x,a_n})^c$ 。したがって、 $A^c \supset \left( \bigcup_{n=1}^N N(x, \epsilon_{x,a_n})^c \right)^c = \bigcap_{n=1}^N N(x, \epsilon_{x,a_n}) = N(x, \epsilon)$ 。ただし、 $\epsilon := \min_{1 \leq n \leq N} \epsilon_{x,a_n}$

## 参考文献